

MIODRAG TODOROVIĆ

Bul. Ilinden br. 85/13

91000 Skopje

Mik. *ze-ro* = gr. Ζήρ-ων

Kad je u pitanju i.e. leksemski minimum  $*g^{h}\mu\bar{e}r-$  za koga se dopušta da je u mikenskoj epohi bio zastupljen u oblicima  $(qe-ro /q^{h}er-\bar{o}n/ \sim$  gr. Θήρων,  $qe-ni-jo /q^{h}er-i\bar{o}n/$  gr. Θηρ-ίων), mišljenja smo da se isti javlja u toj epohi i u obliku *ze-ro*. Na to upućuje, po našem mišljenju mikensko lično ime iz KN Da 5218 *ze-ro* za koga držimo da odgovara grčkom ličnom imenu Ζήρ-ων. Pri tom smatramo da je mikenski silabogram *zer-* u *ze-ro* sa palatalnim izgovorom  $*kj\bar{e}r-$  nastao kao rezultat fonološke opozicije od i.e.  $*g^{h}\mu\bar{e}r-$  iz predmikenske epohe. Najpre prelazom  $*g^{h}\mu\bar{e}r-$  u  $*k^{h}\mu\bar{e}r-$ , te gubitkom aspiracije u  $*k^{h}\mu\bar{e}r-$ , a potom i asimilacijom glasa  $-\mu-$  prema sledećem vokalu  $-\bar{e}-$  u  $*k^{h}\bar{e}r-$   $\rightarrow$   $kj\bar{e}r-$  odnosno, mik. *ze-ro*  $/kj\bar{e}r-\bar{o}n/ \sim$  gr. Ζήρ-ων. Kao najbliža analogija o uproščivanju i.e. palatala ( $k'+\mu$ ) u  $k$  sa stanovišta fonološke opozicije može poslužiti gr. oblik  $\pi\epsilon\lambda\epsilon\kappa\bar{\alpha}\nu$  :  $\pi\epsilon\lambda\epsilon\kappa-\alpha\nu$  : st. ind. *parasu-*  $\langle$  ( $*pelek'\mu a-$ ), (cf. K. Brugman, *Griechische Grammatik*, str.f 51,66.), dok o gubitku glasa  $\mu$  iza  $z = gj$  videti kiparski oblik  $\zeta\alpha\nu$   $\langle$   $*z\omega\alpha n$  kod E. P. Hamp, *CP*, 48, (1953), str. 243 Pri tom ukazujemo da je i J. van. Windikens, *Les Etudes Pelasgiques*, Louvain, 1965, str. 68, 114 povezao i.e. leksemski minimum  $*g^{h}\mu\bar{e}r-$  sa prvim delom Samotračkog toponima Ζηρ-u/ινθος : st. slov. зверь. To pokazuje da pored fonoloških opozicija  $kV$  :  $zV$  ( $*g^{h}$ ,  $*g^{h}$ ,  $*k^{h}$ ), ( $V=e$ ) u mikenskoj epohi valja računati i sa fonološkom opozicijom  $qV$   $\langle$  (i.e.  $*g^{h}\mu\bar{e}r-$ ) :  $zV$   $\langle$  (i.e.  $*kj\bar{e}r-$ ), ( $V=\bar{e}$ ).